

Üretim Tarihi : Bu Bilgiler
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj
Parti No : Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No : 125
Bakanlık Tescil No : 2025TK12228

UYARILAR

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- ÖNERİLEN DOZU AŞMAYINIZ.
- KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

NET AĞIRLIK



ÜRETİCİ FİRMA:
CMI - Ltd - UK
United House 113 High Street,
Collingham, Newark, Notts NG23 7NG
İNGİLTERE



EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
ARCOMAX
20-5-0 + (3MgO) + TE

EC FERTİLİZER NP GÜBRESİ HARMANLANMIŞ **ARCOMAX** 20-5-0 + (3MgO) + TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% w/w
Toplam Azot (N).....	% 20
Amonyum Azotu (N).....	% 1
Üre Azotu (N).....	% 19
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅).....	% 5
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅).....	% 5
Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO).....	% 3
Suda Çözünür Bor (B).....	% 0.2
Suda Çözünür Demir (Fe) (tamamı EDTA şelatlı).....	% 2
Suda Çözünür Mangan (Mn).....	% 4
Suda Çözünür Çinko (Zn).....	% 4
Şelatın Stabil Kaldığı pH aralığı.....	3 - 9



NET AĞIRLIK

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	DOZU (Yapraktan)
NARENCİYE	Çiçek öncesi, fındık büyüklüğünde ve yaz sürgününde uygulama yapılır.	100-150 g/100 L su
BAĞ	Çiçek öncesi ve kuruk dönemde olmak üzere 2 uygulama yapılır.	100-150 g/100 L su
MEYVE AĞAÇLARI	Çiçekten sonra ve 20 gün ara ile 2 uygulama yapılır.	100 g/100 L su
ZEYTİN	Çiçek öncesi ilk ve 15-20 gün sonra 2 uygulama yapılır.	100 g/100 L su
SEBZELER (Sera, örtü altı ve açık alan)	Çiçeklenmeden önce 15-20 gün ara ile 3 uygulama yapılır.	75-100 g/100 L su
KAVUN, KARPUZ	Çıktan 30 gün sonra ve 15 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	75-100 g/100 L su
ÇİLEK	Çiçek öncesi ilk uygulama, 15-20 gün ara ile 3 uygulama yapılır.	75-100 g/100 L su
PAMUK	Tarak öncesi ve 20 gün sonra olmak üzere 2 uygulama yapılır.	100-150 g/da
MISIR	Bilki boyu 40-50 cm olduğunda tek uygulama yapılır.	100 g/da
ŞEKERPANCARI	6 yaprak oluncaya ilk uygulama, 30 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.	100 g/da
ANTEP FISTIĞI	Yapraklanma sonrası ilk, 20 gün aralıyla 2-3 uygulama yapılır.	100 g/100 L su
HUBUBAT	Karşılaşma döneminde tek uygulama yapılır.	100 g/da

- DEPOLAMA**
- Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.
 - Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
 - Depolarda sigara içmeyiniz.
 - Ateşle yakışmayınız.
 - Depolama sıcaklığı -10/+45°C arasında olmalıdır.

KARIŞILIRLIK
ARCOMAX birçok insektisit, fungisit ve herbisit ile karışabilir. Her durumda karışılabilirliğinden emin olmak için ön karışım testi yapılması önerilir.

FİRMA BEYANI
İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketinin aynı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak ceza işlemi peşinen kabul ediyoruz.



İTHALATÇI FİRMA
AMARKO TARIM TİCARET VE PAZ. A.Ş.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No:8
SARIÇAM / ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44 Fax: 0(322) 456 19 47
www.amarkotarim.com.tr
e-mail: info@amarkotarim.com.tr