

Üretim Tarihi : Bu Bilgiler
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj
Parti Numarası : Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No : 125
Bakanlık Tescil No : 23277

UYARILAR

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- ÖNERİLEN DOZU AŞMAYINIZ.
- KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

NET AĞIRLIK




ÜRETİCİ FİRMA:
CMI Ltd-UK
United House 113 High Street,
Collingham, Newark, Notts NG23 7NG
İNGİLTERE



EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
CARMMINA 46
16-8-22+(2MgO)+TE

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
CARMMINA 46
16-8-22+(2MgO)+TE

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % w/w |
|--|--------|
| Toplam Azot (N)..... | % 16 |
| Amonyum Azotu (N)..... | % 5 |
| Nitrat Azotu (N)..... | % 6 |
| Üre Azotu (N)..... | % 5 |
| Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅)... % 8 | |
| Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅)..... | % 8 |
| Suda çözünür Potasyum oksit (K ₂ O)..... | % 22 |
| Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO)..... | % 2 |
| Suda çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA şelatlı..... | % 0.08 |
| Suda çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA şelatlı..... | % 0.2 |
| Suda çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA şelatlı..... | % 0.1 |
| Suda çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA şelatlı..... | % 0.01 |
| Şelatın Stabil Kaldığı pH aralığı..... | 3 - 9 |



NET AĞIRLIK

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU

| Bitkiler | Uygulama Dönemi | Yapraktan |
|--|--|--------------------|
| Narenciye, Bağ ve Meyve Ağaçları | Çiçek öncesi ilk uygulama, 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır. | 150-200 g/100 L su |
| Sebzeler (Sera örtü altı ve Açık alan) | İlk uygulama bitkiler 20 cm iken, 15-20 gün ara ile 2. ve 3. uygulama yapılır. | 200-250 g/100 L su |
| Pamuk | İlk uygulama tarak başlangıcında, 15-20 gün ara ile 2. uygulama yapılır. | 150-250 g/da |
| Kavun, Karpuz | Kollar 15-20 cm iken ilk ve 20 gün sonra 2-3 uygulama yapılır. | 150-200 g/100 L su |
| Mısır | Püskül öncesi tek uygulama | 100 - 150 g/da |

DEPOLAMA

- Serin ve kuru yerde ağız kapalı muhafaza ediniz.
- Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Depolarda sigara içmeyiniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Depolama sıcaklığı -5/+45°C arasında olmalıdır.

KARİŞİBİLİRLİK

CARMMINA 46 birçok insektisit, herbisit ve fungusit ile karışabilir. Karışabilirliğinden emin olmak için ön karışım testi yapınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketin aynısını olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



İTHALATÇI FİRMA
AMARKO TARIM TİCARET VE PAZ. A.Ş.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No:8
SARIÇAM / ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44 Fax: 0(322) 456 19 47
www.amarkotarim.com.tr
e-mail:info@amarkotarim.com.tr