

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FOCUS

12-36-12+(2MgO)+TE



EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

**FOCUS**

12-36-12+(2MgO)+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Toplam Azot (N).....	% 12
Amonyum Azotu (N).....	% 6
Üre Azotu (N).....	% 6
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )....	% 36
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ).....	% 36
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O).....	% 12
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO).....	% 2
Suda Çözünür Bor (B).....	% 0.025
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.01
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.175
Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.06
Suda Çözünür Molibden (Mo).....	% 0.005
Suda Çözünür Tamamı Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.075
Şelatın stabil kaldığı pH aralığı:.....	3 - 9



NET AĞIRLIK:

Ön Yüz

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FOCUS

12-36-12+(2MgO)+TE



**KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU**

Kullanım dozları bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmekte olup genel olarak; **Sebzelerde** 100 L Suya 150 – 200 g, **Meyve ağaçlarında** 100 L Suya 150 – 200 g, **Kesme çiçekte** ise yine dekara 150 – 200 g, 100 L su ile karıştırılarak Çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişme döneminde yapraklardan uygulanır. Toprakdan uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır.

**UYARILAR**

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- ÖNERİLEN DOZU AŞMAYINIZ.
- KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

**DEPOLAMA**

- Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.
- Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Depolarda sigara içmeyiniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Depolama sıcaklığı 0/+45°C arasında olmalıdır.

**KARİŞİBİLİRLİK**

**FOCUS 12-36-12** birçok insektisit, fungusit ve herbisit ile karışabilir. Her durumda karışabilirliğinden emin olmak için ön karışım testi yapılması önerilir.

**FİRMA BEYANI**

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketin aynısını olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

Üretim Tarihi : Bu Bilgiler  
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj  
Parti No : Üzerindedir.  
Bakanlık Lisans No : 125  
Bakanlık Tescil No : 2025TK12249



ÜRETİCİ FİRMA:  
**CMI Ltd-UK**  
United House 113 High Street,  
Collingham, Newark, Notts NG23 7NG  
İNGİLTERE

**NET AĞIRLIK:**



**AMARKO**

İTHALATÇI FİRMA  
**AMARKO TARIM TİCARET VE PAZ. A.Ş.**  
SARIÇAM / ADANA  
Tel: 0 (322) 456 19 44 Fax: 0(322) 456 19 47  
www.amarkotarim.com.tr  
e-mail: info@amarkotarim.com.tr

Arka Yüz