


EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FOCUS
20-20-20+TE

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FOCUS
20-20-20+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% w/w
Toplam Azot (N).....	% 20
Amonyum Azotu (N).....	% 4
Nitrat Azotu (N).....	% 6
Üre Azotu (N).....	% 10
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅)....	% 20
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P ₂ O ₅).....	% 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O).....	% 20
Suda Çözünür Bor (B).....	% 0.01
Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.002
Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.02
Suda Çözünür Manganez (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.01
Suda Çözünür Molibden (Mo).....	% 0.001
Suda Çözünür Tamamı Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlıdır.).....	% 0.002
Şelatın stabil kaldığı pH aralığı:.....	3 - 9



NET AĞIRLIK:

Ön Yüz



EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FOCUS
20-20-20+TE

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FOCUS
20-20-20+TE

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ VE DOZU

Kullanım dozları bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmekte olup genel olarak; **Sebzelerde** 100 L Suya 150 – 200 g, **Meyve ağaçlarında** 100 L Suya 150 – 200 g, **Kesme çiçekte** ise yine dekara 150 – 200 g, 100 L su ile karıştırılarak çiçeklenme öncesi ve sonrasında meyve gelişme döneminde yaprakтан uygulanır. Toprakтан uygulamalarda ise genel olarak 1-2 kg/da dozunda vejetasyon süresince 2-3 defa uygulanır.

UYARILAR

- ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
- SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ.
- DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
- GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
- ÖNERİLEN DOZU AŞMAYINIZ.
- KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.
- KULLANILMIDAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

DEPOLAMA

- Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.
- Ürünü direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Depolarda sigara içmeyiniz.
- Ateşle yaklaşmayınız.
- Depolama sıcaklığı 0/+45°C arasında olmalıdır.

KARIŞILIRLIK

FOCUS 20-20-20 birçok insektisit, fungusit ve herbisit ile karışabilir. Her durumda karışılabilirliğinden emin olmak için ön karışım testi yapılması önerilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Piyasaya sunacağımız ürünün etiketini aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

Üretim Tarihi : Bu Bilgiler
Son Kullanma Tarihi : Ambalaj
Parti No : Üzerindedir.
Bakanlık Lisans No : 125
Bakanlık Tescil No : 2025TK12227

ÜRETİCİ FİRMA:
CMI Ltd-UK
United House 113 High Street,
Collingham, Newark, Notts NG23 7NG
İNGİLTERE

AMARKO
İTHALATÇI FİRMA
AMARKO TARIM TİCARET VE PAZ. A.Ş.
Acıdereoslu Mah. Zafer Cad. No:8
SARIÇAM / ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44 Fax: 0(322) 456 19 47
www.amarkotarim.com.tr
e-mail: info@amarkotarim.com.tr

NET AĞIRLIK:

Arka Yüz